ANÁLISIS DE LENGUAJE

- - Lenacapavir: México autoriza la inyección contra el VIH que se aplica solo dos veces al año; esto debes saber - UNAM Global

UNAM Global - De la comunidad para la comunidad · publicada el 3 nov 2026 · 1,626 palabras
https://unamglobal.unam.mx/global_revista/lenacapavir-mexico-prevencion-vih/

100
de 100

Muy buena

Con perspectiva de género **Respetuosa**

La nota usa un lenguaje respetuoso. Tiene perspectiva de género y de derechos: usa «mujer trans», «hombre trans» o «persona trans», nombra a las personas no binarias, da contexto con datos.

Analizada con el motor v1.6.6 del Analizador de notas.

Términos despectivos	**Sin problemas**
Nombre y género	**Sin problemas**
Culpa a la víctima	**Sin problemas**
Amarillismo	**Sin problemas**
Discurso hostil	**Sin problemas**
Términos imprecisos	**Sin problemas**
Perspectiva de género y derechos	**5 aciertos**
Lenguaje inclusivo	**100%**

El texto, subrayado

Mostramos solo los párrafos donde encontramos algo, para no reproducir la nota completa. Cada estilo de subrayado es un tipo de hallazgo y el número remite a la lista de abajo.

abc Lo que hace bien **abc** Lenguaje inclusivo

Escanea el código para ver este análisis en línea
memoriayresistencia.org/medios/nota/6132
Generado el 4 nov 2026. El análisis es automático y puede equivocarse con la ironía o con citas que la nota critica. Cómo calificamos: memoriayresistencia.org/medios/metodologia.

México dio un nuevo paso en la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) con la autorización sanitaria del lenacapavir, un medicamento de acción prolongada que puede administrarse mediante dos aplicaciones al año como profilaxis preexposición (PrEP).

El 24 de septiembre de 2026, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) anunció el registro sanitario del fármaco, tras evaluar la evidencia científica sobre su calidad, seguridad y eficacia. La decisión incorpora una nueva alternativa preventiva al país, aunque no significa que el medicamento esté disponible de inmediato en hospitales públicos o farmacias.

Sin embargo, una de las diferencias más relevantes para el uso cotidiano es la duración de su efecto. El lenacapavir permite mantener un esquema de PrEP con dos aplicaciones al año, aproximadamente cada seis meses. En cambio, el cabotegravir inyectable se administra cada dos meses después de la fase inicial correspondiente, mientras que la PrEP oral con tenofovir y emtricitabina suele requerir una toma diaria.

El primero se realizó entre mujeres en Sudáfrica y Uganda. El segundo incluyó a hombres que tienen sexo con hombres, personas trans y personas no binarias en varios países, entre ellos México.

Estas cifras corresponden a poblaciones y comparaciones específicas de cada estudio; no deben interpretarse como una comparación directa entre el lenacapavir y el cabotegravir. Los resultados tampoco significan que la protección esté garantizada en todas las circunstancias.

El registro sanitario permite avanzar hacia la comercialización del lenacapavir en México, pero todavía deben resolverse cuestiones relacionadas con su adquisición, financiamiento e

incorporación a los servicios de salud.

Entre los siguientes pasos están estimar cuántas personas podrían beneficiarse, calcular el presupuesto necesario, negociar el costo de adquisición y definir cómo se financiará su incorporación. También será necesario establecer los criterios para identificar a las personas candidatas e incluir esta alternativa en los lineamientos clínicos correspondientes.

La PrEP está indicada para personas que no viven con VIH y que tienen un riesgo sustancial de adquirirlo. Entre ellas hay poblaciones que pueden enfrentar una mayor exposición al virus o barreras para acceder a las medidas preventivas.

Villafuerte García mencionó a hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, personas que realizan trabajo sexual, personas que se inyectan sustancias y personas con parejas sexuales en contextos de exposición al VIH, entre otros grupos.

Antes de iniciar la PrEP es fundamental descartar una infección por VIH. Esta evaluación permite identificar una posible infección preexistente y evitar que una persona que ya vive con el virus reciba únicamente un esquema preventivo, insuficiente para tratar la infección.

Lo que hace bien

- Usa «mujer trans», «hombre trans» o «persona trans»
- Nombra a las personas no binarias
- Da contexto con datos
- Da información útil sobre el VIH
- Usa «trabajo sexual»

Este análisis es gratuito. ¿Nos ayudas a sostenerlo?

Memoria y Resistencia no recibe fondos gubernamentales. Con un donativo desde $50 MXN sostienes el Observatorio de Medios y el registro de memoria de las personas LGBTTTIQANB+.

$50 **$100** **$200** **$500** o en memoriayresistencia.org/dona

Pago seguro con Stripe a través de Nodo Cívico, la organización que impulsa Memoria y Resistencia.

Para proteger a las personas de los casos, el nombre registral no aparece en este documento. Calificación de 0 a 100 hecha con reglas públicas, sin inteligencia artificial de terceros.